

โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัส RABIES

วิธีสังเกต

- ซึมหรือดุร้ายขึ้น
- ลื่นห้อย น้ำลายไหล
- หางตก

ทำอย่างไรเมื่อถูกกัด

- ล้างแผลด้วยน้ำกับสบู่หลายๆ ครั้ง ทำแผลด้วยแอลกอฮอล์และเบตาดีน
- กักสัตว์ไว้พอดูอาการ สอนทามประวัติการฉีดวัคซีนจากเจ้าของหมา
- พบแพทย์ทันที (โดยเฉพาะหากถูกหมาจรจัดกัด)

ระวังพิษสุนัขบ้า (พื้ติดเชื้อรักเขาไม่ได้ ตายอย่างเดียว)

ระยะอาการ กัด ข่วน

แบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 มีไข้ คล้ายไข้หวัด เบื่ออาหารคันแผล	ระยะที่ 2 มีอาการทางประสาท คลุ้มคลั่ง กลัวน้ำ กลัวลม ความรู้สึกไว	ระยะที่ 3 อัมพาต หายใจกระตุก คลุ้มคลั่งตาย
คน 2-3 วัน	3-7 วัน	1-7 วัน
สัตว์ 2-3 วัน	1-7 วัน	1-10 วัน

ระยะที่ 1 อารมณ์เปลี่ยนแปลง
ดุร้ายหรือซึมเศร้า

ระยะที่ 2 กระวนกระวาย
ลื่นห้อย น้ำลายไหล

ระยะที่ 3 อัมพาต ตาย

โรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเกิดขึ้นใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิด

ป้องกันได้โดยพาไปฉีดวัคซีนทุกปี

Find us on facebook
www.facebook.com/setthakithospital